



Ospedale Riuniti Padova Sud
Dipartimento Area Servizi
UOC di Radiologia

**PREMEDICAZIONE AL MEZZO DI CONTRASTO
IODATO/PARAMAGNETICO**
(UROGRAFIA, TC, RMN con mdc)

È indicata una premedicazione nei seguenti casi:

- pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un'indagine con la medesima classe di MdC da impiegare (per es., a base di gadolinio o di iodio);
- presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica;
- mastocitosi;
- pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante).

L'allergia a molluschi, crostacei, pesci o altri alimenti non è da considerarsi un fattore di rischio per reazioni da ipersensibilità a MdC. Anche l'allergia ad altre categorie di farmaci non è da considerare un fattore di rischio per tali reazioni. Un'anamnesi positiva per reazioni da ipersensibilità ad antisettici iodati, quali soluzione di iodopovidone (Betadine) e iodoformio, non costituisce un fattore di rischio per reazioni a MdC a base di iodio.

Per tali pazienti si consiglia una premedicazione con steroidi:

Prednisolone 50 mg per os o Metilprednisolone 32 mg per os
12 e 2 ore prima dell'esame

+

antistaminico (per es cetirizina) e montelukast 10 mg 1 ora prima dell'esame.

Efficacia della premedicazione

In assenza di studi clinici prospettici randomizzati controllati, in pazienti adulti e pediatrici ad alto rischio per reazioni allergiche da mezzi di contrasto, la questione dell'efficacia della premedicazione con l'associazione di un glucocorticoide e un antistaminico resta controversa.

Dichiaro di aver assunto la terapia

Data _____ Firma del paziente / minore consapevole (≥14 anni) _____